



สุขลักษณะสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก

1. สถานที่ตั้ง และโรงเรือน ไม่มีน้ำท่วมขัง มีแสงสว่าง การระบายอากาศที่ดี โรงเรือนมั่นคงแข็งแรง มีสถานที่สำหรับแยกกักกันสัตว์ที่ป่วยออกจากสัตว์เลี้ยงปกติ
2. น้ำดื่มสำหรับสัตว์ มีน้ำดื่มที่สะอาดเพียงพอ ห่างจากแหล่งน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
3. สุขลักษณะส่วนบุคคล พนักงานมีการตรวจสุขภาพประจำปี มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ปีก สวมชุดปฏิบัติงานเหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น หน้ากาก ถุงมือ รองเท้าบูท เป็นต้น
4. การจัดการของเสีย มีบ่อเกรอะหรือ ระบบบำบัดน้ำเสีย ภาชนะรองรับมูลฝอยปิดมิดชิด ไม่รั่วซึมมีปริมาณเพียงพอ มีการจัดการและทำลายซากสัตว์อย่างถูกวิธี
5. ห้องน้ำและการป้องกันเชื้อโรค มีห้องน้ำสะอาดเพียงพอ มีอ่างล้างมือ สบู่ และอุปกรณ์สำหรับทำให้มือแห้ง มีการฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าสู่พื้นที่เลี้ยงสัตว์ มีอุปกรณ์พ่นฆ่าเชื้อโรคที่สามารถใช้งานได้



บุคคลที่เกี่ยวข้อง: ติดเชื้อไขหวัดนก

- ❖ ผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงกับสัตว์ปีก รวมทั้งเด็ก ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ระบาด
- ❖ ผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับนก ไข่ สัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย
- ❖ ผู้ที่ไปท่องเที่ยวหรืออยู่บริเวณที่มีการระบาดของไขหวัดนก
- ❖ ผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไขหวัดนกหรือผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจรุนแรง



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฟาย

โรคไขหวัดนก





โรคไข้หวัดนก

เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ซึ่งพบได้ในสัตว์ปีก



การติดต่อโรคไข้หวัดนกสู่คน

โดยการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายด้วยโรคไข้หวัดนกโดยเชื้อไวรัสในน้ำมูก น้ำลาย และมูลของสัตว์ป่วย อาจติดมากับมือและเข้าสู่ร่างกายคนทางเยื่อจมูกและตา หรือติดเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม



อาการผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก

ในคนที่ติดเชื้อจะมีอาการไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย เจ็บคอ ไอ ผู้ป่วยเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันไม่ดี อาจมีอาการรุนแรง ได้แก่ หายใจลำบาก หอบ



การป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดนกในคน

1. บริโภคอาหารที่ปรุงสุก ทั้งเนื้อ และไข่
2. พยายามรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ
3. หมั่นล้างมือเป็นประจำเพื่อฆ่าเชื้อโรค
4. ผู้ที่มีไข้สูง และมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
5. หากต้องสัมผัสผู้ป่วยที่ติดเชื้อต้องสวมเสื้อคลุมและถุงมือ และควรอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 3 ฟุต



6. ช่วยกันเฝ้าระวังการระบาดของในสัตว์ปีกที่เลี้ยงตามบ้าน
7. ดูแลเด็กๆ ไม่ให้ไปสัมผัสสัตว์ป่วยหรือบริเวณที่อาจปนเปื้อนเชื้อ
8. หากพบสัตว์ปีกตายผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ของสำนักงานเขต
9. ไม่ควรสัมผัสสัตว์ป่วยหรือตายด้วยมือเปล่า
10. ต้องขุดหลุมฝังสัตว์ที่ตายให้ลึกอย่างน้อย 1 เมตร โรยปูนขาวหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือนำไปเผา และให้รับล้างมือด้วยสบู่



การป้องกันการติดเชื้อในสัตว์

- ✓ ควบคุมไม่ให้นักต่างถิ่นเข้ามาในสถานที่เลี้ยงสัตว์
- ✓ ควรแยกขังสัตว์ที่นำเข้ามาใหม่ไว้ก่อนจนพ้นระยะฟักตัวของโรค
- ✓ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ในฟาร์ม
- ✓ ไม่นำวัสดุอุปกรณ์จากพื้นที่แพร่ระบาดมาใช้

