



สาเหตุ

เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ เลปโตสไปรา มีหนูเป็นตัวนำโรค ติดต่อกันจากปัสสาวะของสัตว์ที่ติด เชื้อและปนเปื้อนอยู่ตามน้ำดินเปียก ชื้นหรือพืช พัก เชื้อสามารถไชเข้าสู่ ร่างกายทางผิวหนังตามรอยแผล และรอยขีดข่วน และเยื่อของปาก ตา จมูก



อาการ

มีไข้เฉียบพลันปวดศีรษะรุนแรง หนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อ ตาแดง อาจมีไข้ติดต่อกันหลายวัน สลับกับระยะไข้ลด มีจุดเลือดออก ตามผิวหนังและเยื่อเมือกและไตวาย ถ้ารุนแรงมากอาจเสียชีวิต



การรักษา

ให้ยาปฏิชีวนะโดยเร็วที่สุด จะช่วยลดความรุนแรงและป้องกัน อาการแทรกซ้อนของโรคได้



โรคไข้ฉี่หนู

เลปโตสไปโรซิส & Leptospirosis

การป้องกัน

- หลีกเลี่ยงการว่ายน้ำ แช่หรือลุยในน้ำที่อาจปนเปื้อนเชื้อจากปัสสาวะสัตว์นำโรคถ้าจำเป็นควรสวมรองเท้าบูต
- เกษตรกร ผู้ที่ทำงานที่เสี่ยงต่อโรค ใช้อุปกรณ์อย่าง รองเท้าบูต.
- ถ้าพบสัตว์ติดเชื้อมองแยกออกเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังสัตว์ตัวอื่นๆ หรือเกิดการปนเปื้อนเชื้อบริเวณที่อยู่อาศัย
- ควบคุมกำจัดหนูในบริเวณที่อยู่อาศัย
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่ปศุสัตว์ (เช่น โค กระบือ) และสัตว์เลี้ยง (เช่น สุนัข)



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝาย
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

1422

สายด่วนกรมควบคุมโรค