



## สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

1

ให้ผู้ป่วยหายกันยุง เพื่อป้องกันบุกัดแล้วไปแพร่เชื้อให้คนรอบข้าง



ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่เพื่อพ่นม่านยุงอย่างจริงจัง โดยเปิดบ้านให้เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นม่านยุงตามบ้านต่อ



3

ซื้อสเปรย์/ไม้ตีบุ้ง มากำจัดบุกที่มีเชื้อตามบ้านทุกห้อง ทุกช่องลม โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่อาจเข้าไม่ทันการณ์



4

ลงมือทำแหล่งเพาะพันธุ์บุ้งบริเวณบ้านของบ้านเดียวกัน แล้วกำจัดทั้งลูกน้ำ และแหล่งเพาะพันธุ์บุ้งลาย



5

ช่วงไข้ลงแล้วเช็ค คือช่วงอันตราย ต้องรีบกลับไปหาแพทย์ที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุด



## อาการที่ต้องเฝ้าระวัง



# รณรงค์กำจัดยุงลาย

## ป้องกัน 3 โรค

- ▶ โรคไข้เลือดออก
- ▶ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- ▶ โรคไข้ปวดหัวยุงลาย

## โดยยึดหลัก 3 เก็บ

### 1. เก็บบ้าน

ให้ปลอกใบช่ำเพื่อไม่ให้ยุง藏匿



### 2. เก็บขยะ

เก็บขยะเดียวที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์บุ้ง



### 3. เก็บน้ำ

ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด ไม่ให้ยุง藏匿





## โรคไข้เลือดออก

### สาเหตุ

เกิดจากเชื้อไวรัสเดิมที่ ไทยมีอยู่แล้วเป็นพำนักระยะ



### อาการ

- ไข้สูง
- คลื่นไส้อาเจียน เปื่อยอาหาร
- หน้าแดง อาจพบจุดเลือดที่ผิวนานั้น
- มักจะไข้ในเย็นๆ ไม่มีน้ำมูก
- กคลึงชา疼ในครองค้านขวา

## การรักษาโรคไข้เลือดออก

1. ให้ผู้ป่วยพักผ่อนในที่ๆ มีอากาศดีเยี่ยมให้สะดวก
2. เช็คตัวด้วยน้ำอุ่นร้อนด่า หรือน้ำอุ่นบ่อบ่ำ
3. รับประทานยาลดไข้ ชนิดพาราเซตามอลเวลาไข้สูง หรือปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามพื้นมากๆ ห้ามรับประทานยาลดไข้ชนิดอื่น เช่น ยาแอสไพริน ยาของลดไข้ หรือยาพอกใบบูรุโรเพ่น เนื่องจากอาจจะทำให้เสื่อมคล่องมากขึ้น ปกติ หรือตัววายได้
4. ห้ามฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ และไม่รับประทานอาหารอื่นที่ไม่จำเป็น
5. ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเกลือแร่ (ORS) หรือน้ำผลไม้ใส่เกลือ เสื้อกันอย่าง ควรดื่มน้ำ เครื่องดื่มที่มีสีแดง ด้วย หรือน้ำคลอ ไปพับแพบท์ตามนัด เพื่อตรวจเสื่อม ติดตามการดำเนินไปของโรค
6. ไปพบแพทย์ตามนัด เพื่อตรวจเสื่อม ติดตามการดำเนินไปของโรค



## โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

### อาการ



หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาการเหล่านี้จะทุเลาลงภายใน 2-7 วัน

การติดเชื้อในครรภ์ อาจทำให้เกิดภาวะศีรษะเล็กในเด็กแรกเกิด (Microcephaly)

### การรักษา

1. พักผ่อนให้เพียงพอ
2. ดื่มน้ำมากๆ
3. หากมีไข้ให้กินยาพาราเซตามอล ห้ามกินยาแอสไพริน เพราะอาจทำให้เสื่อมคล่องในอวัยวะภายในได้

หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์



## โรคไข้ป่วงข้อบุ้งลาย

“โรคไข้ป่วงข้อบุ้งลาย” หรือ “โรคชิกุนกุนยา” (Chikungunya) เป็นเชื้อไวรัสที่มีบุ้งลายเป็นพาหนะนำโรค โดยเป็นไวรัสในจีนัสแอลฟาวิรัส (Alphavirus) ซึ่งติดต่อมาผ่านบุ้งลายที่มีไวรัสชนิดนี้ พบรดูในทุกกลุ่มอายุ

### อาการของโรคไข้ป่วงข้อบุ้งลาย

- มีไข้สูงอย่างร้าบเร้า ประมาณ 40 องศาเซลเซียส
- มีไข้เป็นเวลากับอาการไข้สูงอย่างเรื้อรัง ที่น้ำ ไข้เด่นเฉพาะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก กระดูกอ่อน กระบากอก หัวใจมีเสื่อมคล่องตามไข้หวัดใหญ่
- อาการปวดขาหนีบได้ภายใน 1-12 ชั่วโมง
- อาการไข้ติดต่อตัวบุ้งลาย

## การรักษา

1. กินยาแก้ปวด เพื่อลดไข้ (ไม่ควรใช้ยาแอสไพริน หรือใบบูรุโรเพ่น เนื่องจากจะทำให้เกิดเสื่อมคล่องมากขึ้น)
2. ดื่มน้ำและนอนหลับ พักผ่อนให้พอเพียง
3. เช็คตัวด้วยน้ำสี acidic เพื่อช่วยลดไข้