

# สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อมงลาย (โรคชิคุนกุนยา) จังหวัดแพร่

สัปดาห์ที่ 23 วันที่ 4 - 10 มิ.ย. 66



จำนวนผู้ป่วยสะสม แยกรายอำเภอ



จำนวนผู้ป่วย

ผู้ป่วยรายใหม่ **+14** ราย

ผู้ป่วยสะสม **39** ราย  
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66

จำนวนผู้เสียชีวิต

0

ราย

## โรคไข้ปวดข้อมงลาย (โรคชิคุนกุนยา)

เกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya virus) มีข้อมลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ทุกกลุ่มอายุ มีอาการคล้ายโรคไข้เลือดออก แตกต่างกันที่ไม่มีการรื้อของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด จึงไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงขั้นช็อก

### อาการสำคัญ



มีไข้สูงจับพั่น



ปวดตามข้อ เช่น นิ้วมือ ข้อศอก ข้อเข่า



มีผื่นขึ้นทั่วตัว



ตาแดง

### การรักษา

- รักษาตามอาการ
- แพทย์อาจให้ยาแก้ปวดหรือยาในกลุ่มต้านอักเสบในผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อ
- ดื่มน้ำและพักผ่อนให้เพียงพอ
- เช็ดตัวด้วยน้ำสะอาด หรือกินยาลดไข้ (ห้ามใช้ยาแอสไพริน หรือไอบูโพรเฟนในการลดไข้)

ข้อมูล : ระบบรายงาน 506 สสจ.แพร่ และกรมควบคุมโรค  
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.แพร่ ติดต่อ : 054511145 ต่อ207

# สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดแพร่

สัปดาห์ที่ 23 : วันที่ 4 - 10 มิ.ย. 66

จำนวนผู้ป่วย

ผู้ป่วยรายใหม่ **+30** ราย

ผู้ป่วยสะสม **149** ราย  
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66

จำนวนผู้เสียชีวิต

0

ราย

**โรคไข้เลือดออก**  
**ภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้าม**

จำนวนผู้ป่วยสะสม แยกรายอำเภอ



### มาตรการ 3 เก็บ



เก็บบ้าน : เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก



เก็บขยะ : เก็บขยะ เก็บภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง



เก็บน้ำ : เก็บน้ำมิดชิด ปิดฝาภาชนะ เปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือปล่อยปลาหางนกยูงกินลูกน้ำ



# สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อขยุกลาง (โรคชิคุนกุนยา)

## จังหวัดแพร่

สัปดาห์ที่ 23 วันที่ 4 - 10 มิ.ย. 66



จำนวนผู้ป่วยสะสม  
แยกรายอำเภอ



จำนวนผู้ป่วย

ผู้ป่วยรายใหม่ **+14** ราย

ผู้ป่วยสะสม **39** ราย  
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66

จำนวน  
ผู้เสียชีวิต

0

ราย

### โรคไข้ปวดข้อขยุกลาง (โรคชิคุนกุนยา)

เกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya virus)  
มีขยุกลางเป็นพาหะนำโรค พบได้ทุกกลุ่มอายุ  
มีอาการคล้ายโรคไข้เลือดออก  
แตกต่างกันที่ไม่มีอาการรุนแรงของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด  
จึงไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงขั้นช็อก

#### อาการสำคัญ



มีไข้สูงจับพฝัน



ปวดตามข้อ  
เช่น นิ้วมือ ข้อศอก  
ข้อเข่า



มีผื่นขึ้นทั่วตัว



ตาแดง

#### การรักษา

- รักษาตามอาการ
- แพทย์อาจให้ยาแก้ปวดหรือยาในกลุ่มต้านอักเสบในผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อ
- ดื่มน้ำและพักผ่อนให้เพียงพอ
- เช็ดตัวด้วยน้ำสะอาด หรือกินยาลดไข้ (ห้ามใช้ยาแอสไพริน หรือไอบูโพรเฟนในการลดไข้)

ข้อมูล : ระบบรายงาน 506 สสจ.แพร่ และกรมควบคุมโรค  
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.แพร่ ติดต่อ : 054511145 ต่อ207